


*Podarcis hispanica* (Steindachner, 1870). Lagartija ibérica.

Hemos recogido 75 citas correspondientes a esta especie: 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 31, 33, 35, 36, 39, 49, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 81, 82, 106, 108, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 178, 185, 186, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 208, 211 y 228.

Se trata quizá de uno de los saurios más abundantes en Salamanca, ocupa gran parte de la provincia si bien es notable la falta de citas en una gran zona del área centrooccidental. Su más importante factor limitante a la dispersión está constituido por la presencia de masas o estructuras rocosas que conforman su microhabitat idóneo. Es probable, pues, que las modificaciones inherentes al sistema de explotación en dehesas, haya provocado la rarefacción de la lagartija ibérica. Cabe señalar, sin embargo, que *Podarcis hispanica* posee una extraordinaria capacidad de dispersión y colonización (Pérez-Mellado, 1981 a). Las mayores densidades de población provinciales se sitúan en el Sistema Central.

Las citas bibliográficas de esta especie no han sido, en su mayoría, incluidas en este trabajo ya que se remontan a un período anterior a la distinción de *Podarcis hispanica* y *Podarcis bocagei* (Arnold y Burton, 1978; Pérez-Mella-



do, 1981 b), y por lo tanto deben ser tomadas con cautela. De este modo, Martínez-Rica (1979) cita la especie como *Lacerta hispanica bocagei*, si bien admite la existencia de varias formas diferentes bajo tal denominación y la necesidad de un estudio más profundo del tema.

*Podarcis bocagei* (Seoane, 1884). Lagartija de Bocage.

Se señalan 14 localidades provinciales: 121, 127, 128, 129, 145, 152, 157, 177, 178, 201, 204, 205, 206 y 208.

La lagartija de Bocage se circunscribe en Salamanca a la mitad occidental de las sierras meridionales. Su límite oriental está constituido por el complejo mediterráneo del sur (cuenca del Alagón), sin alcanzar la sierra de Béjar (ver más detalles en Pérez-Mellado, 1981 b). Ocupa únicamente las zonas del robleal de *Quercus pyrenaica* y sus etapas subseriales, sin penetrar, ni en áreas de alta montaña, ni en las llanuras adeshadas septentrionales al Sistema Central. La provincia de Salamanca constituye el límite meridional conocido hasta la fecha en España (Pérez-Mellado, 1981 c).

