

**PSAMMODROMUS ALGIRUS** (Linneo, 1758). **Lagartija colilarga.**



**DESCRIPCION**

Lagartija de gran tamaño, con la cabeza mediana. Los miembros son estilizados y los posteriores bastante más largos que los anteriores. Lo más espectacular de su morfología es la extraordinaria longitud de su cola, de 2,5 a 3 veces la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos. Presenta las escamas dorsales fuertemente carenadas, detalle que también se observa en las escamas laterales. La coloración es variable, parda, marrón cobrizo u oliváceo, presentando a cada lado del cuerpo dos rayas blanquecino-amarillentas bordeadas de bandas oscuras. Las partes inferiores son también blanquecino-amarillentas. Los machos en celo presentan una coloración naranja brillante que se extiende desde el nivel de los ojos hasta la inserción de los miembros anteriores, pasando por la garganta. Esta mancha es de extensión variable dependiendo de cada individuo. Llega a sobrepasar los 300 mm de longitud total.

**BIOLOGIA**


La actividad de esta lagartija se desarrolla durante el día y a lo largo de todo el año, con picos de máxima actividad en los meses de mayo a junio y septiembre. En Cádiz, sin embargo, no es raro ver adultos activos en los días soleados del Invierno. Se alimenta principalmente de insectos, arácnidos, etc. a los que no duda en perseguir para darles caza. Se han citado casos de canibalismo. El celo comienza en primavera, probablemente en abril. A los 15-20 días de la cópula la hembra pone entre 3 y 11 huevos redondeados, y ya en Agosto no es difícil ver corretear los pequeños *Psammodromus*.

## HABITAT

Prefiere zonas con denso matorral y pinares con abundante pinocha. Aunque la mayor parte de su vida la pasa en el suelo, no duda en subirse a los matorrales para protegerse o cazar. Los jóvenes, debido a la presión territorial de los adultos, tienden a desplazarse a otras áreas.

## STATUS Y DISTRIBUCION

Se encuentra en amplios territorios de la provincia con relativa abundancia. Verticalmente asciende en Cádiz hasta los 800-900 m. Evita las zonas donde el suelo presenta escasa o nula cobertura vegetal, ya que es una de las especies más exigentes en lo que al porte de la vegetación arbustiva se refiere.



Distribución de *Psammodromus algirus*