

LACERTA LEPIDA Daudin, 1802. **Lagarto ocelado.**



DESCRIPCION

Este gran lagarto, tiene un aspecto robusto, con la cabeza bastante grande y potentes miembros que terminan en fuertes uñas, sobre todo las posteriores. El colorido del dorso es muy característico, con un dibujo reticular verdiamarillento. Lo que da nombre a la especie es la presencia de ocelos azules bordeados de negro dispuestos en tres o cuatro hileras que van desde los hombros hasta la raíz de los miembros posteriores. Los jóvenes típicamente poseen en el dorso de 11 a 14 series longitudinales de ocelos blanquecino-amarillentos bordeados de negro, que se extienden también por la parte posterior de la cabeza y la base de la cola. Las partes inferiores son blanco amarillentas. Los machos alcanzan los 235 mm de longitud cabeza-cuerpo, si incluimos la cola. Han llegado a medirse ejemplares de más de 800 mm. Las hembras son algo menores.

BIOLOGIA

En Cádiz lo observamos todo el año, con dos picos de máxima actividad en mayo y septiembre; sin embargo es posible verlo esporádicamente los días calurosos de diciembre y enero. Su actividad es diurna refugiándose, no obstante, durante las horas más cálidas del día en un agujero cavado por él mismo, normalmente bajo una gran piedra o en una madriguera abandonada. Si es acorralado y la huida le es imposible no duda en defenderse; se yergue sobre sus patas delanteras y levanta la cabeza con la boca abierta dispuesto a morder.

Se alimenta normalmente de insectos, moluscos, arácnidos, etc. En líneas generales podemos decir que captura a toda presa de tamaño adecuado que encuentra a su alcance, sin desdeñar la materia vegetal, como los frutos del *Juniperus*. Los especímenes de mayor tamaño también predan sobre lagartijas y ratones. En los meses de abril y mayo pueden observarse combates entre los machos por la posesión de una hembra, tras los cuales el macho vencedor copula con ella. Alrededor de un mes más tarde la hembra pone de 5 a 24 huevos que eclosionarán unos dos o tres meses después de la puesta.

HABITAT


El lagarto ocelado es quizás el lacértido menos exigente a la hora de elegir hábitat: lo mismo se le encuentra en pinares costeros con suelo arenoso y claros de matorral como en laderas montañosas, llanuras, pastizales y claros de bosque. En Cádiz alcanza los 1.100 m de altitud.

STATUS Y DISTRIBUCION

Otrora abundante en toda la provincia, observamos como lentamente van disminuyendo los efectivos de su población, sobre todo en zonas costeras y agrícolas. Las causas de esta disminución están intimamente relacionadas con las actividades humanas, desde la incidencia negativa que tienen los productos fitosanitarios que, a través de su dieta, se incorporan al organismo con fatales consecuencias, a la caza que sufre por parte de agricultores y en los cotos de caza, sobre todo los grandes especímenes.

OBSERVACIONES

En la mayor parte de la Península habita la subespecie *L. l. lepida*, excepto en Murcia, Alicante y Almería de donde se ha descrito la subespecie *L. l. nevadensis*



Distribución de *Lacerta lepida*