

Gen. **ALGIROIDES** BIBRON, 1835

Écailles dorsales très grandes, imbriquées, fortement carénées ; les ventrales lisses, faiblement imbriquées ou non. Collier bien marqué. Narine percée entre 2 ou 3 nasales, en contact ou étroitement séparée de la première labiale. Paupière inférieure écailleuse. Doigts légèrement comprimés latéralement, pourvus au-dessous de lamelles lisses ou tuberculeuses. Queue cylindrique, longue. Pores fémoraux présents.

Six espèces représentent ce genre ; trois se rencontrent dans le Sud de l'Europe et trois en Afrique tropicale. Une seule, appartenant à la faune de la Corse, est à mentionner ici.

Algiroides Fitzingeri (WIEGMANN). — *Notopholis Fitzingeri* WIEGM., Herp. Mex., 1834, p. 10. — *Lacerta Fitzingeri* DUM. et BIBRON, Erp. Gén., V, 1839, p. 194. — *Algiroides Fitzingeri* BEDRIAGA, Abh. Senck.

Ges., XIV, 1886, p. 405 ; BOULENGER, Cat. Liz., III, 1887, p. 46 et Monogr. Lacert., I, 1920, p. 340.

Tête petite, fortement déprimée, à museau obtusément pointu. Rostrale touchant juste la narine ou étroitement séparée d'elle. 2 petites écailles postnasales superposées: 4 labiales en avant de la sous-oculaire. Une série de granules entre les supraoculaires et les supraciliaires. Occipitale plus courte et parfois plus large que l'interpariétale. Tempes garnies d'écailles irrégulières ; plaque tympanique et supratemporale grande, celle-ci en contact avec la quatrième supraoculaire. 16 à 20 écailles entre le collier et la troisième paire de plaques gulaires. Collier à bord fortement denticulé, formé de 5 à 7 plaques.

Écailles dorsales finement pointues, à peine plus grandes que les latérales, la longueur desquelles répond à celle des ventrales. 15 à 18 écailles autour du milieu du corps. Ventrales en 6 séries longitudinales, les médianes et les externes les plus étroites et 21 à 23 séries transversales. Écaille préanale bordée par un demi-cercle de petites plaques ; 9 à 13 pores fémoraux de chaque côté. Queue épaisse, 1 1/2 à 2 fois plus longue que la tête et le corps ensemble.

Longueur totale : ♂, 115 mm. ; queue : 78 mm. ; ♀ : 114 mm. ; queue : 71 mm.

COLORATION. — Au-dessus, olivâtre bronzé sombre ; au-dessous, orangé.

Biologie. — Vit en Corse et en Sardaigne, jusqu'à 1.100 m. d'altitude. C'est le plus petit de tous les représentants de la famille.