

LE LÉZARD VERT OCCIDENTAL

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Ancien nom scientifique : *Lacerta viridis*

Autre nom français : Lézard vert à deux raies

Ce n'est que récemment que le Lézard vert occidental a été élevé au rang d'espèce. Il était autrefois considéré comme une sous-espèce du Lézard vert, *Lacerta viridis*. Ce nom est maintenant réservé au Lézard vert oriental.



DESCRIPTION

Le Lézard vert occidental est un lézard de taille moyenne: jusqu'à 43 cm queue comprise.

Celle-ci est longue (2 fois ou plus la longueur totale de l'animal quand elle n'est pas sectionnée).

Le Lézard vert occidental est moins trapu que le Lézard des souches. La coloration de la face dorsale est verte. Le mâle est généralement finement tacheté de noir et présente au printemps une coloration bleue sur la gorge (rare chez les femelles). Deux lignes claires longitudinales sont présentes sur le dos des femelles subadultes et persistent parfois à l'âge adulte. Le juvénile est brun clair à verdâtre uniforme ou avec quelques stries claires étroites, et sa gorge est vert pomme.

BIOLOGIE

Le Lézard vert occidental a des mœurs très semblables au Lézard des souches.

Les pontes contiennent de 6 à 23 œufs. Les jeunes lézards éclosent au bout de 7 à 15 semaines. Ils mesurent alors 7 à 9 cm de longueur totale. La maturité sexuelle est acquise entre 1 et 2 ans en général.

Le régime alimentaire est composé principalement d'invertébrés, mais le Lézard vert occidental consomme également à l'occasion des fruits ainsi que des œufs et des oisillons.

HABITATS

Le Lézard vert occidental est plus thermophile que le Lézard des souches. Il apprécie les milieux secs et bien ensoleillés (affleurements gréseux) avec des zones de végétation dense : pelouses sèches, milieu bocager (haies), lisières et clairières de boisements, landes, dunes...

RÉPARTITION

Le Lézard vert occidental est présent principalement du nord de l'Espagne à l'ouest de l'Allemagne. En France, il est présent au sud d'une ligne Rouen-Soissons-Mulhouse. L'espèce est présente en Île-de-France, elle y est classée peu commune mais elle est plus répandue dans le sud que dans le nord. Elle n'a jamais été mentionnée en Seine-Saint-Denis, bien que le département soit compris dans son aire de répartition.