

1 экз.	12098.	Учь-Кудукъ (близъ Термеза).	Бухара.	16. V.
2 „	12099.	Акъ-Кудукъ	„ „	17. V.
1 „	12100.	Пески Катта-Кумы	„ „	18. V.

Ящерка средняя найдена только въ окрестностяхъ Термеза. Что касается установленнаго А. М. Никольскимъ подвида *transcaspica*, то въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ чисто индивидуальнаго характера колебаніемъ признаковъ; среди экземпляровъ В. Я. Лаздина попадаются экземпляры и той и другой формы, пойманные бокъ о бокъ. Да и вообще повсюду, гдѣ только водится эта ящерка, обѣ формы встрѣчаются виѣтъ; такимъ образомъ, прежде всего, противъ подвида *transcaspica* говоритъ самое главное — отсутствіе опредѣленной области распространенія.

#### *Scapteira grammica* Лиснт.

2 экз.	12102.	Окр. Старога Термеза.	Бухара.	15. V.
2 „	12103.	Пески Катта-Кумы (бл. Термеза).	„	18. V.
2 „	12101.	Репетекъ, Закасп. обл.		3. V.

#### *Scapteira grum-grzimaïloï* Ведр.

3 экз.	12104.	Окр. Старога Термеза.	Бухара.	15. V.
7 „	12105.	Харгали (на западъ отъ Термеза).	„	10. V.
6 „	12106.	Окр. Патта-Гиссара (Термезъ).	„	15. V.

#### *Scapteira lasdini* species nova.

1 экз.	12107.	Пески Катта-Кумы бл. Термеза.	Бухара.	18. V.
--------	--------	-------------------------------	---------	--------

Къ сожалѣнію, добытъ только одинъ экземпляръ этой интересной и оригинальной ящерицы. По первому впечатлѣнію напоминаетъ *Sc. grum-grzimaïloï*, но при болѣе внимательномъ осмотрѣ бросается въ глаза меньшее количество темныхъ полосъ на спинѣ — 5 (*Sc. grum-grzimaïloï* 7), а также habitus *Scapteira scripta*; на эту послѣднюю нашъ видъ походитъ прежде всего тѣмъ, что морда у него тоже заострена, носовые щитки вздуты слабо, межчелюстной щитокъ широкимъ швомъ отдѣленъ отъ задненосового, а также тонкимъ и стройнымъ сложениемъ. Отличается отъ *Sc. scripta* сильно развитыми ребрышками на верхней и даже нижней сторонѣ хвоста, а также и окраской; сверху песочно-желтаго цвѣта съ 5 продольными темнобурими полосами. У *Sc. scripta* хвостовая чешуя сверху со слабыми ребрышками, снизу гладкая; тѣло сверху песочно-

сѣраго цвѣта, на спинѣ узкія темно-бурыя или черныя пятна, сливающіяся частью въ продольныя полосы, частью въ узоръ въ видѣ клѣточекъ.

Голова маленькая, замѣтно отграничена отъ шеи, сплюснутая въ дорзовентральномъ направленіи, болѣе всего расширена въ височной области, затѣмъ слабо суживается по направленію къ глазничной, а отсюда сильно суживается по направленію кпереди и переходитъ въ умѣренно-длинную, острую морду; бока морды, въ области верхнегубныхъ щитковъ, падаютъ вертикально, надъ верхнегубными щитками наклоняются впередъ, образуя такимъ образомъ тупой уголъ и, пересѣкаясь подъ острымъ угломъ съ верхней площадкой морды, образуютъ навѣсъ надъ верхнегубными щитками. По линіи пересѣченія боковъ морды съ ея верхней площадкой, какъ и у *Sc. scripta*, незамѣтно такой вдавленности, каковая наблюдается у *Sc. grum-grzimailoi*.

Носовыя отверстія заложены сбоку и частью обращены вверхъ, окружающіе ихъ щитки вздуты слабо. Швы между щитками врѣзаны довольно глубоко, но не такъ, какъ у *S. grum-grzimailoi*, глазница узкая и длинная, на верхней части подглазничнаго щитка рѣзко выраженный, дугообразно изогнутый кантъ. Тѣлосложеніе тонкое и стройное, туловище умѣренно длинное, тонкое и закругленное, чуть замѣтно утолщенное въ серединѣ. Конечности тонкія и длинныя съ длинными тонкими пальцами; переднія конечности, вытянутыя впередъ, заходятъ концами пальцевъ за конецъ морды, заднія доходятъ до передняго края уха.

Межчелюстной щитокъ умѣренной величины, носовые щитки вздуты слабо, нижній изъ нихъ большимъ промежуткомъ, равнымъ  $\frac{1}{2}$  длины перваго верхнегубнаго щитка, отдѣленъ отъ межчелюстнаго, передненосовой длиннымъ швомъ соприкасается съ I верхнегубнымъ. Лобноносовой щитокъ довольно большой, длина его равна длинѣ предлобныхъ и равна его ширинѣ; посрединѣ его замѣтна вдавленность. Лобный щитокъ съ довольно глубокой бороздкой въ передней части, которая далѣе кзади переходитъ въ мелкій желобокъ; такимъ образомъ, вдоль всего щитка проходитъ желобокъ, довольно глубокой спереди, постепенно мелѣющій по направленію кзади и сзади мелкій. Два большихъ надглазничныхъ щитка окружены полнымъ рядомъ зернышекъ; площадка впереди I надглазничнаго

покрыта четырьмя поперечными рядами зернышекъ, позади II надглазничнаго одинъ, раздваивающійся кнаружи рядъ зернышекъ и одинъ небольшой удлиненный щитокъ. Межтемянной щитокъ небольшой въ видѣ трапезоида, темянные щитки снаружи по бокамъ головы загибаются внизъ и переходятъ на бока головы; щитки эти широкіе, ширина ихъ значительно больше ихъ длины. Затылочнаго щитка нѣтъ. Височныя чешуйки мелкія, гладкія, зернистыя, отверстіе уха не зазубрено. Верхнегубныхъ щитковъ 9, большой подглазничный щитокъ касается глаза и помѣщается между VI и VII верхнегубными; нижнегубныхъ щитковъ 6—7, нижнечелюстныхъ 5 паръ, изъ нихъ щитки трехъ переднихъ паръ касаются другъ друга. Воротникъ состоитъ изъ 11 увеличенныхъ, въ сравненіи съ горловыми, чешуекъ, между воротникомъ и III парой нижнечелюстныхъ щитковъ насчитывается, по средней линіи горла, 22 ряда чешуекъ. Спинная чешуя мелкая, зернистая, по бокамъ нѣсколько увеличенная. Брюшные щитки расположены въ 31 поперечный рядъ, ихъ продольные ряды косые и подъ угломъ сходятся по направленію къ средней брюшной линіи; въ самомъ длинномъ поперечномъ ряду насчитывается 12 щитковъ, длина которыхъ немного превосходитъ ихъ ширину. Анальные щитки мелкіе, хвостовая чешуя съ рѣзкими ребрышками на верхней сторонѣ хвоста и немного менѣе рѣзкими на нижней. Бедряныхъ поръ 10—11.

Голова и тѣло сверху песчанаго цвѣта, на спинѣ 5 продольныхъ темно-бурыхъ полосъ, изъ которыхъ обѣ крайнія шире 3 среднихъ; по бокамъ тѣла, отъ подмышки до основанія заднихъ ногъ, по одной темно-бурой узкой полосѣ. Обѣ внѣшнія крайнія спинныя полосы переходятъ на бока головы, затѣмъ проходятъ по вискамъ, черезъ глазъ и впереди глазъ въ видѣ уже узкой линіи доходятъ до носовыхъ щитковъ. Двѣ внутреннія крайнія спинныя полосы тоже переходятъ на голову, проходятъ по внѣшнему краю темянныхъ щитковъ, переходятъ на надглазничные и образуютъ по краямъ ихъ кайму. Головные щитки украшены узоромъ изъ линій и пятенъ. Центральная спинная полоса на шеѣ прерывается и оканчивается небольшой поперечной перекладиной, а на серединѣ спины образуетъ вправо и влѣво выступы, около которыхъ расположено нѣсколько небольшихъ пятнышекъ. На затылкѣ рисунокъ въ видѣ гранаты, раздѣленной вдоль на двѣ половины.

Внѣшнія спинныя полосы переходятъ на бока хвоста, двѣ внутреннія у основанія хвоста, сливаются въ одну, которая и протягивается по его верхней сторонѣ; центральная полоса прерывается у основанія хвоста. Ноги сверху темно-бураго цвѣта, съ бѣлыми круглыми пятнами. Вся нижняя сторона тѣла животнаго чистаго бѣлаго цвѣта.

Къ сожалѣнію, единственный экземпляръ этой ящерицы съ поврежденнымъ хвостомъ, а потому нельзя дать полную таблицу важнѣйшихъ измѣреній:

Длина головы . . . . .	9,5 мм.
Высота головы . . . . .	4,2 "
Ширина головы въ области висковъ . . . . .	6 "
" " " глазъ . . . . .	5,4 "
Ширина морды въ области ноздрей . . . . .	2 "
Длина туловища . . . . .	28 "
Высота туловища . . . . .	5 "
Ширина туловища близъ подмышекъ . . . . .	4,4 "
" " у мѣста прикр. задн. ногъ . . . . .	5 "
" " посрединѣ . . . . .	6 "
Разстояніе отъ передн. края глаза до конца морды . . . . .	4,6 "
Длина передней конечности . . . . .	16 "
" задней " . . . . .	22,1 "
Разстоян. отъ основ. передн. ноги до конца морды . . . . .	15 "
" " " задн. ноги до передн. края уха . . . . .	22,1 "

Единственный оригинальный экземпляръ добытъ В. Я. Лаздинымъ въ пескахъ Катта-Кумы, близъ Термеза въ Южной Бухарѣ.

**Scapteira scripta** STR.

1 экз. 12108. Харгали (на западъ отъ Термеза). Бухара.	10. V
2 " 12109. Репетекъ, Закасп. обл.	3. V

**Ablepharus brandtii** STR.

1 экз. 12110. Дивдаръ-Боле (между Чубекомъ и Калаи-Хумбомъ).	Бухара. 16. VI.
1 " 12111. Термезъ	" VII.
6 " 12112. Таби-Дара (Дарвазъ)	" 9. VIII.

Этотъ аблефаръ водится въ горахъ большей части Южной Бухары; В. Я. Лаздинъ встрѣтилъ этотъ видъ, начиная съ предгорій близъ Термеза и далѣе на востокъ, включительно до Дарваза (Таби-Дара).